

SYSTEMATIQUE DES CHIROPTERES D'EUROPE

Fichier : SystématiquechirosEurope

Toutes les espèces de chauve-souris se rattachent à la classification générale concernant les MAMMIFERES :

-Règne ANIMAL -Embranchement des VERTEBRES -Classe des MAMMIFERES

Ordre des CHIROPTERES L'ordre des CHIROPTERES , comporte près d'un millier d'espèces dans le monde .

En Europe, 39 espèces sont reconnues (41 avec les îles atlantiques...), selon la classification ci-dessous :

FAMILLE	GENRES	ESPECES	Noms français / Remarques
RHINOLOPHIDAE	<i>Rhinolophus</i> (<i>Rhinolophes</i>)	<i>Rhinolophus ferrum equinum</i>	Grand Rhinolophe fer à cheval
		<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Petit rhinolophe fer à cheval
		<i>Rhinolophus euryale</i>	Espèce menacée en RhoneAlpes .Troglophile
		<i>Rhinolophus mehelyi</i>	R. de Mehely . Disparu de France ?
		<i>Rhinolophus blasii</i>	Rhinolophe de Blasius Absent de France .
VESPERTILIONIDAE	<i>Myotis</i> (<i>Murins</i>)	<i>Myotis daubentoni</i>	Murin de Daubenton
		<i>Myotis capaccinii</i>	Murin de Capaccini . Méditerranéen
		<i>Myotis dasycneme</i>	Murin des marais .Nord et Est de la France
		<i>Myotis brandti</i>	Murin de Brandt
		<i>Myotis mystacinus</i>	Murin à moustaches : gris-noir
		<i>Myotis alcaethoe</i>	Murin d'Alcaethoe .Proche de <i>M.mystacinus</i>
		<i>Myotis emarginatus</i>	Murin à Oreilles échancrées
		<i>Myotis nattereri</i>	Murin de Natterer
		<i>Myotis bechsteini</i>	Murin de Bechstein
		<i>Myotis myotis</i>	leGrand Murin : grande taille
		<i>Myotis blythii</i>	le Petit Murin
		<i>Myotis punicus</i>	Murin du Maghreb (trouvé en Corse et Sardaigne)
		<i>Myotis aurascens</i>	Balkans. Proche de <i>M.mystacinus</i>
	<i>Nyctalus</i> (<i>Noctules</i>)	<i>Nyctalus noctula</i>	Noctule commune
		<i>Nyctalus leisleri</i>	Noctule de Leisler (en foret)
		<i>Nyctalus lasiopterus</i>	Grande Noctule (mal connue en France)
	<i>Pipistrellus</i>	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Pipistrelle commune : (fréquence 45kHz)
		<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Pipistrelle pygmée (fréquence 55kHz)
		<i>Pipistrellus kuhli</i>	Pipistrelle de Kuhl
		<i>Pipistrellus nathusii</i>	Pipistrelle de Nathusius : migrations importantes
	<i>Ypsugo</i>	<i>Hypsugo savii</i>	Vespère de Savi. Plutot méridionale
	<i>Eptesicus</i> <i>Vespertilio</i> (<i>Sérotines</i>)	<i>Eptesicus serotinus</i>	Sérotine commune (arboricole)
		<i>Eptesicus nilssoni</i>	Sérotine de Nilsson (ou boréale)
		<i>Vespertilio murinus</i>	Sérotine bicolore (forestière)
		<i>Eptesicus bottae</i>	Sérotine de Botta : ile de Rhodes (Grèce)
		<i>Vespertilio sodalis</i>	Sérotine de Barret-Hamilton : Roumanie, Suisse
	<i>Plecotus</i> (<i>Oreillards</i>)	<i>Plecotus auritus</i>	Oreillard commun (ou <i>roux</i>)
		<i>Plecotus austriacus</i>	Oreillard gris (ou <i>méridional</i>)
		<i>Plecotus macrobullaris</i>	Oreillard montagnard : à rechercher
		<i>Plecotus kolombatovici</i>	Oreillard des Balkans
		<i>Plecotus sardus</i>	Oreillard de Sardaigne
	<i>Barbastella</i>	<i>Barbastella barbastellus</i>	Barbastelle
	Miniopteridae	<i>Miniopterus</i>	<i>Miniopterus schreibersi</i>
MOLOSSIDAE	<i>Tadarida</i>	<i>Tadarida teniostis</i>	Molosse de Cestoni

Daniel Ariagno. Mise à jour décembre 2006

La tendance moderne est de mettre les minioptères dans une famille à part des vespertilionidae. Pour être absolument complet, il faudrait encore ajouter (Bull. SFEPM n°34 août 1997) : la Pipistrelle de Madère *Pipistrellus maderensis*, la Noctule des Açores *Nyctalus azoreum*, et l'Oreillard de Ténérife *Plecotus teneriffae*. Je n'ai pas retenu la chauve-souris cendrée, espèce occasionnelle nord américaine n'appartenant pas (encore !) à la faune européenne. Biblio disponible.